

## <ข้อแนะนำ หากมีอาการผิดปกติ หลังจากฉีดวัคซีน> (태국어)

หากเป็นเช่นนั้น, ควรปฏิบัติ ดังนี้.

· หลังจากฉีดวัคซีน หากมีอาการปวด,บวม บริเวณที่ฉีดวัคซีน,

**ให้ใช้ผ้าเช็ดตัวแห้งสะอาด วางข้างบนประคบเย็น.**

· หลังจากฉีดวัคซีน หากมีไข้ต่ำๆ, **ให้ดื่มน้ำมากๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ**

· หลังจากฉีดวัคซีน หากเกิดอาการไม่สบาย มีไข้สูง หรือปวดกล้ามเนื้อ

**ใช้ทานยาแก้ปวดลดไข้** บรรเทาอาการได้.

\* ก่อนฉีดวัคซีนให้เตรียมยาแก้ปวด ลดไข้

ที่มีส่วนผสมของอะเซตามิโนเฟน และหลังฉีดวัคซีน

หากมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ให้ทานยาแก้ปวด ลดไข้ได้.

หากเป็นเช่นนั้น, รีบเข้ารับการรักษากับแพทย์

· หลังจากฉีดวัคซีน ผ่านไป 48 ชั่วโมงแล้ว หากบริเวณที่ฉีดวัคซีน ยังไม่ดีขึ้น ยังมี **อาการปวด, บวม, แดง**

· ภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากฉีดวัคซีน กรณีที่เกิด**อาการ ต่างๆเช่น หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก, ปวดท้อง ต่อเนื่อง,ขาบวม**

· หลังจากฉีดวัคซีน หากมีอาการปวดหัวรุนแรง หรือปวดต่อเนื่องนานกว่า 2วัน **รับประทานยา**

**แก้ปวดแต่ยาไม่ตอบสนอง หรือไม่สามารถควบคุมอาการปวดได้** ตาพร่ามัว

· หลังจากฉีดวัคซีน หากเกิดอาการ**ไม่มีแรงผิดปกติเฉียบพลัน แตกต่างจากทุกๆวัน**

· หลังจากฉีดวัคซีน หาก**เกิดรอยช้ำหรือมีจุดเลือดออก**ในบริเวณอื่น ที่ไม่ใช่บริเวณที่ฉีดวัคซีน

หากเป็นเช่นนั้น, ให้โทรแจ้ง**119** หรือไปห้องฉุกเฉินทันที

· หลังจากฉีดวัคซีน **หายใจติดขัด** หรือ อาการหน้ามืดวิงเวียนรุนแรง

· หลังจากฉีดวัคซีน **หากปาก, หน้าบวม หรือผื่นขึ้นทั้งตัว**รุนแรง

· หลังจากฉีดวัคซีน เกิด**อาการชัก หรือหมดสติทันที**

< แปลโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาโทรศัพท์ทานูรี 1577-1366 >